

# BOLFO GOLD 250 | HOND 10-25 KG | 4 PIPETTEN

**Doeldier(en):** Honden.

**Leeftijd:** Jong, Volwassen, Senior

**Toedieningswijze:** Spot-on oplossing.  
Heldere gele tot lichtbruine oplossing.

**Werkzaam tegen:** Vlooien

**Omschrijving:** Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij honden van 10 kg tot minder dan 25 kg lichaamsgewicht.  
Voor honden van minder dan 10 kg lichaamsgewichten of van 25 kg en meer, gebruik het geschikte Bolfo® Gold vlooiendruppels hond product (zie rubriek 4.9).  
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.

**Contra-indicaties:** Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.  
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

**Dosering/Toediening:** Dosering en Behandelingsschema

| Hond (kg lichaamsgewicht) | Product                              | Aantal pipetten | Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht) |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| < 4 kg                    | Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 40  | 1 x 0,4 ml      | minimaal 10                          |
| >= 4 - 10 kg              | Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 100 | 1 x 1,0 ml      | minimaal 10                          |
| >= 10 - 25 kg             | Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 250 | 1 x 2,5 ml      | minimaal 10                          |
| >= 25 - 40 kg             | Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 400 | 1 x 4,0 ml      | minimaal 10                          |
| >= 40 kg                  | Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 400 | 2 x 4,0 ml      | minimaal 10                          |

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.

Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.

In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Wijze van toediening

Neem een pipet uit de verpakking. Voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer twee pipetten gebruiken. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.

Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht:

Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Voor honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer:

De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet moet gelijkmatig op drie tot vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht.

Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

Voor alle honden:

Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken.

Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

**Werkzame bestanddelen:**

Werkzaam bestanddeel:

Imidacloprid 250 mg/pipet (2,5 ml van een 10% oplossing)

Hulpstoffen:

Butylhydroxytolueen (E321) 2,5 mg/pipet

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

**Bijwerkingen:**

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten (zie rubriek 4.9: 'Dosering en wijze van toediening').

In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.

**Waarschuwingen:**

Geen

**Verpakking:**

Geen

**Verdere info:**

Geen

