

DOLTHENE ORALE SUSPENSIE | 100 ML

Doeldier(en):	Honden.
Leeftijd:	Pup, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze:	Suspensie voor orale toediening.
Werkzaam tegen:	Spoelwormen, Haakwormen, Zweepwormen, Lintwormen, Dipylidium lintworm.
Omschrijving:	Bestrijding van maagdarmworm- en lintworminfecties bij pups en volwassen honden. Maagdarmnematoden: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> en <i>Trichuris vulpis</i> . Cestoden: <i>Taenia pisiformis</i> en <i>Dipylidium caninum</i> .
Contra-indicaties:	Geen.
Dosering/Toediening:	Toedieningsweg: oraal, direct in de bek of over het voer. Dosering: 10 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 opeenvolgende dagen. Wijze van toediening: Goed schudden voor gebruik. Bepaal het gewicht van het dier en meet met behulp van bijgeleverde doseerspuit de juiste hoeveelheid van het product af. Over het voer spuiten of direct in de bek legen.
Werkzame bestanddelen:	Per ml 22,65 mg oxfendazol.
Bijwerkingen:	Geen bekend.
Waarschuwingen:	Het product kan veilig worden toegepast in de laatste 14 dagen van de dracht. Aan het begin van de dracht dient terughoudendheid te worden betracht met betrekking tot het gebruik van dit middel, in verband met mogelijke embryotoxische effecten. Het product kan veilig worden toegepast tijdens de lactatie. In verband met lokale overgevoelighedsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.
Verpakking:	HDPE flacon (20, 50 of 100 ml) met HDPE schroefdop en met een LDPE doseerspuit.
Verdere info:	Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium http://repertorium.fidin.nl