

EFFIPRO SPOT-ON HOND XL | 40-60 KG | 4 PIPETTEN

Doeldier(en):	Hond.
Leeftijd:	Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze:	Spot-on oplossing.
Werkzaam tegen:	Vlooien, Teken
Omschrijving:	Vlooien- en tekenbestrijding.
Contra-indicaties:	In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 2 maanden oud of die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening:	Alleen voor uitwendig gebruik. Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet zodat alle vloeistof zich onderin bevindt. Knip of breek het topje van de pipet af langs de breuklijn. Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.
Werkzame bestanddelen:	Bevat per pipet 402 mg fipronil.
Bijwerkingen:	Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Waarschuwingen:	Wassen van de hond 1 uur voor de behandeling heeft geen effect op de werkzaamheid van het product tegen vlooien. Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product moet worden vermeden. Wekelijks baden in water gedurende 1 minuut vermindert de werkingsduur tegen vlooien met 1 week. Het product voorkomt geen aanhechting van teken aan de dieren. Als de dieren zijn behandeld voordat ze met de teken in aanraking komen, zullen de teken binnen 24-48 uur na aanhechting worden gedood. Eenmaal dood zullen de teken van het dier afvallen of, indien ze achter blijven, kunnen ze makkelijk verwijderd worden. Behandel in geval van een massale infestatie de omgeving met een geschikte omgevingsspray om de werkingsduur van het product te maximaliseren. Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten tegelijkertijd te worden behandeld. Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts. Speciale voorzorgen: Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig spoelen met water. Gebruik het product niet op wonden of beschadigde huid. Kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, vermijd daarom contact van het product met de mond en ogen. Indien toch aanraking met de ogen

plaatsvindt, onmiddellijk en grondig met water spoelen. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg een arts en laat de verpakking of bijsluiter zien. Vermijd dat de inhoud in contact komt met de huid. Indien dit wel gebeurt, wassen met water en zeep. Handen wassen na gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens toediening. Dieren of toedieners met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden. Behandelde dieren niet aanraken tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

Verpakking:

Doos à 4 pipetten.

Verdere info:

Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium <http://repertorium.fidin.nl>