

FIPRODOG | 40-60 KG | 3 PIPETTEN

Doeldier(en):	Fiprodog 67 mg: hond (2-10 kg) Fiprodog 134 mg: hond (10-20 kg) Fiprodog 268 mg: hond (20-40 kg) Fiprodog 402 mg: hond (40-60 kg)
Leeftijd:	Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze:	Geen
Werkzaam tegen:	Vlooien, Teken
Omschrijving:	Voor de behandeling van vlooieninfestaties bij honden. Heeft een insecticide werking tot 6 weken tegen nieuwe vlooieninfestaties. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis indien dit eerder is vastgesteld door een dierenarts. Hoewel het product niet altijd een direct acaricide effect vertoont (verschillende teken kunnen nog aanwezig zijn na 48 uur), heeft het een aanhoudend acaricide effect tot 4 weken tegen <i>Dermacentor variabilis</i> en tot 3 weken tegen <i>Rhipicephalus sanguineus</i>.
Contra-indicaties:	Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn, dient het diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 2 maanden en/of pups die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs overlijden het gevolg kunnen zijn. Dit diergeneesmiddel is speciaal ontwikkeld voor honden. Gebruik het niet bij katten omdat dit tot overdosering kan leiden. Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening:	Uitsluitend voor toepassing op de huid. • 1 pipet Fiprodog 67 mg van 0,67 ml is voldoende voor de behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 2 tot 10 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. • 1 pipet Fiprodog 134 mg van 1,34 ml is voldoende voor de behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 10 kg tot 20 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. • 1 pipet Fiprodog 268 mg van 2,68 ml is voldoende voor de behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 20 kg tot 40 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. • 1 pipet Fiprodog 402 mg van 4,02 ml is voldoende voor de behandeling van een hond met een lichaamsgewicht van 40 kg tot 60 kg overeenkomend met de aanbevolen minimale dosis van 6,7 mg fipronil/kg lichaamsgewicht. • Voor honden die zwaarder wegen dan 60 kg gebruikt u twee pipetten van 2,68 ml.

Het minimale interval tussen twee behandelingen dient niet korter te zijn dan 4 weken.

Werkzame bestanddelen: Elke pipet van Fiprodog 67 mg bevat: Fipronil 67 mg
Elke pipet van Fiprodog 134 mg bevat: Fipronil 134 mg
Elke pipet van Fiprodog 268 mg bevat: Fipronil 268 mg
Elke pipet van Fiprodog 402 mg bevat: Fipronil 402 mg

Bijwerkingen: Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van verhoogde speekselproductie optreden, voornamelijk veroorzaakt door de eigenschappen van de dragerstof in het product. Onder de zeer zelden optredende bijwerkingen na gebruik zijn gemeld: voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilferen, alopecia, pruritus en erytheem) en algemene pruritus of alopecia. Na gebruik zijn bij uitzondering overmatig speeksel, reversibele neurologische verschijnselen (hyperesthesie, depressie, aandoeningen van het zenuwstelsel), braken of ademhalingsproblemen gerapporteerd. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Waarschuwingen: Het diergeneesmiddel voorkomt geen tekeninfestaties. Teken zullen meestal binnen 48 uur na de infestatie sterven. Er kunnen echter nog vastzittende teken (zowel dood als levend) worden waargenomen na die tijd. Sommige van deze teken hebben een bloedmaaltijd gehad. De sterfte vindt meestal plaats voordat de teek zich volledig heeft vastgehecht zodat het risico van overdracht van infectieziekten minimaal is, maar niet volledig kan worden uitgesloten. Zodra de teken dood zijn vallen zij van het dier af; resterende teken kunnen door zachtjes trekken worden verwijderd. Voor de optimale controle van vlooienplagen in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten behandeld te worden met een goedgekeurd insecticide. De vlooien van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair, die in geval van een grote plaag in het begin van de bestrijding behandeld moeten worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen. Van het één a twee uur voor behandeling wassen met een medische shampoo, gevolgd door grondig drogen, en het eenmaal per week baden gedurende een periode van 6 weken is aangetoond dat het de werking van dit geneesmiddel tegen vlooien niet beïnvloedt. Gedurende twee dagen na de behandeling met het diergeneesmiddel moet baden en erg nat worden van de vacht worden vermeden.

Verpakking: Een doordrukstrip bestaat uit 3 blisters met elk een pipet. Verpakkingen met 3, 6, 12, 24, 60 en 120 pipetten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Verdere info: Geen