

MILBEMAX KAT | 20 TABL

Doeldier(en):	Kat.								
Leeftijd:	Jong, Volwassen, Senior								
Toedieningswijze:	Filmomhulde tablet. Langwerpig gevormd, roodachtig tot roodachtig bruine tablet, rundvlees smaak met een inkerving op beide zijdes. Een zijde vertoont de indruk "KK", de andere zijde "NA".								
Werkzaam tegen:	Spoelwormen, Haakwormen, Lintwormen, Dipylidium lintworm, Echinococcus lintworm, Hartworm								
Omschrijving:	Kat: de behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden zoals: - Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis - Nematoden: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartworminfectie, wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.								
Contra-indicaties:	Niet toedienen aan katten die minder dan 2 kg wegen.								
Dosering/Toediening:	Minimum aanbevolen dosering: 2 mg milbemycline oxime en 5 mg praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend. Het product toedienen met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartworm ziekte. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt: <table><tr><th>Gewicht kg</th><th>Tabletten</th></tr><tr><td>2-4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>>4-8</td><td>1</td></tr><tr><td>>8-12</td><td>1 1/2</td></tr></table> MILBEMAX kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartworm ziekte, wanneer gelijktijdig een behandeling tegen lintworm nodig is. Gedurende een maand is MILBEMAX preventief tegen hartworm ziekte. Als er regelmatig een behandeling ter preventie van hartworm ziekte wordt ingezet, heeft een monovalent product de voorkeur.	Gewicht kg	Tabletten	2-4	1/2	>4-8	1	>8-12	1 1/2
Gewicht kg	Tabletten								
2-4	1/2								
>4-8	1								
>8-12	1 1/2								
Werkzame bestanddelen:	1 tablet bevat 16 mg Milbemycline oxime en 40 mg Praziquantel.								
Bijwerkingen:	In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.								
Waarschuwingen:	Geen.								

Verpakking:

PVC/PE/PVdC aluminium blister. Doos met 20 tabletten in blister.

Verdere info:

Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk
op Fidin Online Repertorium <http://repertorium.fidin.nl>