

PRAC-TIC HOND S | 4.5-11 KG | 6 PIPETTEN

Doeldier(en): Honden.

Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior

Toedieningswijze: Kleurloze tot gele, heldere spot-on oplossing.

Werkzaam tegen: Vlooien, Teken

Omschrijving: Ter behandeling en preventie van vlooienbesmettingen (*Ctenocephalides canis* en *C. felis*) bij honden. De duur van de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe besmettingen met vlooien houdt minstens 4 weken aan. Het diergeneesmiddel kan ingezet worden als onderdeel van de behandelingsstrategie bij Flea Allergy Dermatitis (FAD). Tot minimaal 4 weken na behandeling worden de volwassen vlooien gedood voordat zij eitjes leggen. Prac-tic onderbreekt levenscyclus van de vlo doordat het de complete ei productie elimineert.
Voor de behandeling en preventie van teken besmettingen (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*) bij honden. Het diergeneesmiddel heeft een aanhoudende acaricide werkzaamheid tegen teken gedurende 4 weken.

Contra-indicaties: Niet toedienen aan honden met een leeftijd van minder dan 8 weken, of met een lichaamsgewicht minder dan 2 kg.
Niet toedienen in geval van een bekende overgevoeligheid voor verbindingen behorende tot de phenylpyrazole klasse of één van de hulpstoffen.
Niet toedienen aan zieke (systemische aandoeningen, koorts) of herstellende dieren.
Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet toedienen aan katten, dit kan tot overdosering leiden.
Niet toedienen aan konijnen.

Dosering/Toediening: De aanbevolen minimum dosering is 12,5 mg/kg lichaamsgewicht pyriprole, overeenkomend met 0,1 ml/kg lichaamsgewicht Prac-tic spot-on oplossing.

Gewicht kg	Volume van 12,5% (w/v) oplossing (ml)	Pyriprole (mg/kg lichaamsgewicht)
>4,5-11	1,1	12,5-30,6

Binnen iedere gewichtsklasse dient de totale inhoud van de pipet van de juiste grootte te worden gebruikt.

Werkzame bestanddelen: 1 ml bevat 125 ml Pyriprole.

Bijwerkingen: De volgende lokale reacties kunnen worden waargenomen op de plaats van toediening: verkleuring van de vacht, lokale haaruitval of jeuk. Lokale cosmetische effecten zoals een vetzig uiterlijk of samengeklit haar zijn normaal. Wanneer bovenstaande voorkomt zal dit binnen 24 uur na toediening verdwijnen. Een korte periode van

speekselen kan optreden wanneer het dier zich likt op de behandelde plaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen teken van vergiftiging en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Een correcte toediening zal het likken van de behandelde plaats minimaliseren.

Waarschuwingen:

Dit diergeneesmiddel is voor de behandeling van honden die besmet zijn met teken en volwassen vlooien. Alle aanwezige honden in hetzelfde huishouden dienen te worden behandeld. In geval van een zware besmetting dient voorafgaand aan de behandeling de omgeving van de hond te worden gestofzuigd en behandeld met een geschikt insecticide. Honden niet wassen met shampoo of baden binnen 48 uur voor de behandeling. Onderdompeling van het dier in water of wassen met shampoo binnen 24 uur na de behandeling kan de effectiviteit van het product reduceren. Daarentegen had een wekelijkse onderdompeling in water geen nadelig effect op de werkzaamheid tegen vlooien en teken.

Verpakking:

Doosje met 2 blisters met elk 3 pipetten.

Verdere info:

Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium <http://repertorium.fidin.nl>